



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Padova, 13 dicembre 2017

**SCOPERTA LA “PIETRA” DI ROSETTA DI UN TERREMOTO FOSSILE
È L’UNICO ESEMPIO AL MONDO DI UN SISMA DI SUBDUZIONE PROFONDA (90 KM)
AVVENUTO 45 MILIONI DI ANNI FA**

Ritrovati da un team di ricerca formato da Marco Scambelluri, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, **Giorgio Pennacchioni**, Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, Mattia Gilio, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, Fabrizio Nestola, Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, in collaborazione con le Università di Erlangen in Germania e Utrecht in Olanda, **campioni di roccia perfettamente conservati riconducibili a un terremoto fossile avvenuto 45 milioni di anni fa**. Le rocce, scoperte sulla collina di Moncuni (località Trana, Torino, Alpi Cozie) e perfettamente conservate, testimoniano un antico sisma di subduzione (scorrimento di una placca sotto un'altra e suo conseguente trascinarsi verso il basso) avvenuto a 90 km di profondità. Sono **l'unico esempio al mondo di un terremoto fossile in una placca oceanica esumata da tali profondità e spiegano quanto avviene nelle zone di subduzione circumpacifiche attuali**.

Nella ricerca pubblicata su «Nature Geoscience» ([articolo](#)) viene descritta la storia di queste rocce. Si tratta di materiali originatisi nella Tetide Mesozoica, una placca oceanica nata nel Giurassico (160 milioni di anni fa) durante le prime fasi di apertura dell'Oceano Atlantico, subdotti 45-55 milioni di anni fa sino a profondità di 90 km, e successivamente incorporati nella catena alpina. Il terremoto fossile di Moncuni si sviluppò durante la subduzione della Tetide. La cicatrice di questa area è oggi rappresentata dalla Catena alpina che ha intrappolato al suo interno frammenti dell'originario oceano con le testimonianze fossili dei terremoti di subduzione.



Foto 1



«L'antica sismicità profonda è testimoniata» **afferma Giorgio Pennacchioni**, Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova «dal ritrovamento di una roccia chiamata *pseudotachilite*, nata dalla solidificazione di un fuso silicatico formatosi per attrito durante il movimento sismico, ovvero durante lo scorrimento di una frattura (faglia) a velocità elevate di circa 1 metro al secondo. Nelle catene montuose è possibile trovare, anche se raramente, rocce che sono state portate in subduzione fino a oltre 100 km all'interno della Terra. Tuttavia le rocce diagnostiche di un movimento sismico sono difficilmente conservate venendo comunemente cancellate durante il percorso verso la superficie. Identificare queste rocce equivale a trovare la “Pietra” di Rosetta che ci consente di “tradurre” direttamente le strutture delle rocce nei processi chimico-fisici avvenuti in un terremoto».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

«L'eccezionalità della scoperta di Moncuni» dice **Marco Scambelluri** dell'Università di Genova «sta nella perfetta conservazione di pseudotachiliti di subduzione, risparmiate dai processi di trasformazione durante il tragitto verso la superficie terrestre. Questo è dovuto al fatto che il pacchetto di rocce contenente le pseudotachiliti è rimasto impermeabile all'ingresso dei fluidi acquosi che accelerano la trasformazione di rocce e minerali. Le si potrebbero definire “*rocce secche*” perché hanno mantenuto intatte, come un laboratorio sterile, le strutture generate da terremoti profondi. Il fuso silicatico che ha prodotto le pseudotachiliti ha cristallizzato minerali come il granato di composizione chimica compatibile con la formazione in ambienti profondi. Inoltre, a conferma della loro origine profonda in una zona di subduzione, le pseudotachiliti si sono formate contemporaneamente ad alcuni minerali (granato e onfacite) la cui formazione indica condizioni di 550 °C a 90 km. L'associazione di pseudotachiliti e “*rocce secche*”» **continua Scambelluri** «è una delle parti rilevanti della scoperta poichè ha permesso di escludere una delle più accreditate ipotesi per lo sviluppo di terremoti profondi, che prevedeva la frammentazione della roccia in presenza di fluidi acquosi in pressione. Questo meccanismo è probabilmente attivo solo per la parte superiore, idrata, delle placche in subduzione, detto canale di subduzione. Ne consegue che il terremoto fossile registrato dalle rocce di Moncuni appartiene a un ambiente sismico non idrato e più interno alle placche subdotte, di cui il materiale ritrovato è, ad oggi, l'unica testimonianza giunta in superficie».



L'attività sismica e vulcanica sono espressioni dirette della vitalità del nostro pianeta. Per questa ragione lo studio dei terremoti e dei vulcani è di importanza primaria nelle Scienze della Terra. Le profondità a cui si generano i terremoti sono inaccessibili all'osservazione diretta e lo studio dei meccanismi deformativi della sorgente di un terremoto si basa sull'analisi delle onde sismiche rilevate in superficie, su esperimenti di laboratorio che riproducono i sismi su campioni in scala ben lontani da quelli reali e su modelli fisici computazionali.

Non esiste un'interpretazione scientifica condivisa che spieghi i processi meccanici che avvengono in profondità durante un terremoto. Si discute di deformazioni localizzate che accelerano progressivamente fino a uno scivolamento sismico (con velocità di circa 1 metro al secondo) come conseguenza del calore prodotto lungo queste zone, o di processi che invocano l'intervento di alte pressioni dei fluidi rilasciati progressivamente dalle rocce della placca subdotta.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA




Foto 2

Ma, vista l'inaccessibilità diretta di questi ambienti profondi e di una teoria condivisa, non rimane che "aspettare" qualche roccia ritornata in superficie che contenga le tracce di terremoti avvenuti in passato.

I devastanti terremoti di subduzione attuali vengono distinti, in base alla profondità della sorgente sismica, in superficiali (inferiori a 50 km), intermedi (tra 50 e 330 km) e profondi (maggiori di 300 km). Si generano nel Pacifico lungo i margini delle placche tettoniche che formano il guscio esterno frammentato della Terra e, in particolare, lungo le zone di subduzione, dove una placca oceanica si immerge sotto un'altra placca sprofondando nel mantello terrestre. Le rocce di Moncuni sono la testimonianza diretta di un ambiente sismico profondo sinora inesplorato e permetteranno di avviare una nuova e avvincente linea di ricerca dedicata alla genesi dei terremoti.

Fossil intermediate-depth earthquakes in subducting slabs linked to differential stress release,
«Nature Geoscience»

<https://www.nature.com/articles/s41561-017-0010-7>

Autori: Marco Scambelluri, Giorgio Pennacchioni, Mattia Gilio, Michel Bestmann, Oliver Plümper e Fabrizio Nestola

Foto 1 Spessa vena di pseudotachilite (al centro della foto) in affioramento a Moncuni (Trana, Torino). Si tratta di una roccia di faglia prodotta durante un movimento sismico e testimonia il terremoto fossile avvenuto 45 milioni di anni fa durante la subduzione dell'antico oceano della Tetide.

Foto 2 La pseudotachilite vista al microscopio. Gli aggregati raggiati rappresentano finissimi cristalli cresciuti durante il raffreddamento veloce del fuso generato per attrito durante il terremoto. La dinamica di crescita di questi cristalli è molto simile a quella che produce i cristalli scheletrici dei fiocchi di neve. Le parti più scure della pseudotachilite sono costituite da vetro, derivato dalla solidificazione del fuso, straordinariamente preservato durante il processo di esumazione dalla profondità di 90 km.

Contatti:

**UFFICIO STAMPA UNIVERSITÀ DI
PADOVA**

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA

MARCO MILAN CELL. 3204217067

TEL. 049/8273041-3066-3520

E-MAIL: stampa@unipd.it

AREA STAMPA: <http://www.unipd.it/comunicati>

**UFFICIO STAMPA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA**

Teobaldo Boccadifuoco

Via Balbi, 5 – 16126 Genova

Tel. 010 209-9290

ufficiostampa@unige.it