




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UFFICIO STAMPA
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA
TEL. 049/8273041-3066-3520
E-MAIL: stampa@unipd.it
AREA STAMPA: <http://www.unipd.it/comunicati>

Padova, 8 marzo 2018

IL “TUFFO” DI 780 KM DELLA CROSTA OCEANICA ECCO DOVE NASCONO I DIAMANTI

Pubblicato su «Nature» l'[articolo](#) di **Fabrizio Nestola del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova** che individua nel mantello inferiore, a ben 780 Km dalla superficie, la sede di formazione del carbonio purissimo.




Uno dei principali obiettivi della geologia della Terra solida è quello di comprendere la mineralogia del nostro pianeta dalla superficie fino alle sue grandi profondità. Infatti, la composizione mineralogica (chimica, struttura cristallina e caratteristiche fisiche) del nostro pianeta combinata con le variazioni di pressione e temperatura influenzano l'intera dinamica terrestre.

In questo contesto entrano in gioco i diamanti naturali: questi rari e costosi “oggetti” sono capaci di

fornire informazioni dirette da grandi profondità perché trasportano fino alla superficie impurità al loro interno in forma di micro frammenti di Terra profonda.

Fabrizio Nestola e il suo team, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Pavia, del CNR-IGG di Padova e due atenei canadesi (Alberta e British Columbia), hanno rinvenuto un piccolo cristallo con composizione CaSiO_3 di appena 0.03 millimetri, inglobato all'interno di un frammento di diamante 40 volte più grande, che fornisce preziose informazioni sulle profondità alle quali possono cristallizzare i diamanti e sui processi di subduzione profondi. Il prezioso naturale, oggetto dello studio, proviene dalla miniera sudafricana vicino a Pretoria in cui nel 1869 venne rinvenuto il diamante grezzo più grande della storia - il famoso *Cullinan* dell'incredibile peso di 3.107 carati.

Le inclusioni di CaSiO_3 scoperte da Fabrizio Nestola dimostrano che il diamante si è formato all'incredibile profondità





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UFFICIO STAMPA


AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA

TEL. 049/8273041-3066-3520

E-MAIL: stampa@unipd.it

AREA STAMPA: <http://www.unipd.it/comunicati>



di 780 km in un settore della Terra chiamato “mantello inferiore” (dai 660 km fino al limite con il nucleo terrestre che inizia a 2900 km di profondità). Vedi figura 1.

Finora la formazione di diamanti nel mantello inferiore era stata solo ipotizzata data l'impossibilità materiale di raggiungere quelle profondità. Infatti solo attraverso esperimenti ad altissima pressione e temperatura effettuati in laboratorio si è teorizzato che nel mantello inferiore potrebbero

essere rinvenute la perovskite Mg SiO_3 (circa 75-80%), l'ossido $(\text{Mg,Fe})\text{O}$ (circa il 10-15%) e proprio la fase scoperta da Fabrizio Nestola, la perovskite CaSiO_3 (circa 5-10%).

Il cristallo individuato all'interno del diamante studiato appartiene a una grande famiglia di composti cristallini molto noti per le loro enormi applicazioni tecnologiche e chiamati “perovskiti”, poiché assumono lo stesso assetto alla scala atomica del minerale CaTiO_3 (chiamato perovskite).

La composizione chimica della perovskite CaSiO_3 rinvenuta nel diamante sudafricano è di estremo interesse perché non si presenta in forma pura, ma contiene un certo grado di impurezza cioè un 6% di titanio. Esperimenti in laboratorio indicano che un tale contenuto di titanio nella CaSiO_3 si può trovare solo a una profondità di 780 km.

«Il nostro lavoro» **dice Fabrizio Nestola** «fornisce una chiara evidenza dell'origine superficiale dell'impurità: il materiale che ha poi dato origine al cristallino CaSiO_3 deriverebbe dalla crosta oceanica terrestre (materiale superficiale) che sarebbe andata in subduzione fino al mantello inferiore, come previsto teoricamente dalla geofisica, ma mai dimostrato empiricamente prima di questa pubblicazione. Dati di laboratorio» **continua Nestola** «indicano che la perovskite CaSiO_3 è il quarto minerale più



abbondante della terra dopo la perovskite MgSiO_3 , l'ossido di ferro e magnesio $(\text{Mg,Fe})\text{O}$ e l'olivina $(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$. La CaSiO_3 però è l'unica fase che riesce a trasportare dall'alto a grandi profondità elementi radioattivi come uranio e torio (U e Th). Questi ultimi potrebbero essere tra i generatori di calore che a loro volta creano nuove e inaspettate dinamiche terrestri a quelle profondità. Il lavoro pubblicato su «Nature» dimostra definitivamente» **conclude Nestola** «che la crosta oceanica e il carbonio superficiale vengono subdotti fino al mantello inferiore. In un prossimo futuro, una volta raccolti dati in una statistica consolidata di campioni naturali, si potrebbe confermare l'ipotesi, già validata dagli esperimenti in laboratorio, che la CaSiO_3 trasporti gli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UFFICIO STAMPA

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA

TEL. 049/8273041-3066-3520

E-MAIL: stampa@unipd.it

AREA STAMPA: <http://www.unipd.it/comunicati>



elementi radioattivi a grandi profondità, elementi capaci di contribuire in modo significativo all'attuale produzione di calore del mantello».

CaSiO₃ perovskite in diamond indicates the recycling of oceanic crust into the lower mantle - Nature - F. Nestola, N. Korolev, M. Kopylova, N. Rotiroti, D. G. Pearson, M. G. Pamato, M. Alvaro, L. Peruzzo, J. J. Gurney, A. E. Moore e J. Davidson

Link alla Ricerca:
<https://www.nature.com/articles/nature25972>

Figura 1 Rappresentazione grafica della placca oceanica in subduzione verso il mantello inferiore

Foto 1 Fabrizio Nestola

Foto 2 La miniera di Cullina presso Pretoria (Sudafrica) - Photo credit: Petra Diamonds

Foto 3 Assortimento di diamanti dalla miniera di Cullinan - Photo credit: Petra Diamonds

Foto 4 Diamante di 232 carati dalla miniera di Cullinan - Photo

credit: Petra Diamonds

Autori:

F. Nestola - Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova

N. Korolev & M. Kopylova, Department of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, University of British Columbia, Vancouver

N. Korolev, Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS

N. Rotiroti, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano

D. G. Pearson, Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta

M. G. Pamato, Department of Earth Sciences, University College London

M. Alvaro, Department of Earth and Environmental Sciences, University of Pavia

L. Peruzzo, CNR-Istituto di Geoscienze e Georisorse, Sezione di Padova

J. J. Gurney, University of Cape Town, Cape Town, South Africa

A. E. Moore, Rhodes University, Grahamstown, South Africa

J. Davidson, Petra Diamonds, Bryanston, South Africa